

VÆKST

2021 – uge 13

Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel

Målrret bekæmpelsen mod de ukrudtsarter, som ikke kan frarenses græsfrøene, og som giver udbyttetab eller høstbesvær. Rapgræsser (enårig og alm.) er et alvorligt problem, fordi arterne påvirker kvaliteten i den høstede vare og ikke - eller kun vanskeligt - kan frarenses. Haremad og skræppe er vanskelige at frarenses i alle de storfrøede græsarter/sorter. Endelig skal de arter bekæmpes, som forekommer i så store mængder, at der er risiko for direkte udbyttetab, høstbesvær eller kraftig forøgelse af frøpuljen i jorden.


Tokimbladet ukrudt i foråret i rødsvingel og alm. rajgræs

Almindelig tokimbladet ukrudt bør bekæmpes tidligt forår, mens rodukrudt som skræpper, tidsler m.v. først kan bekæmpes senere i foråret i begyndende strækning under lune forhold med Ariane FG S. (rødsvingel og alm. rajgræs) eller Mustang Forte (kun alm. rajgræs). Midlernes anbefalede dosis og temperaturkrav for god effekt ses i tabel 1. Nedenstående oversigter viser Zypars brede effekt overfor forskellige ukrudtsarter.


Tabel 1. Oversigt over forskellige midlers effekter og temperaturkrav.

Middel	Dosering, ltr./ha	Temperaturkrav	Bemærkning	Godkendelse
Legacy	0,07-0,1	Ved vækststart	God effekt på agerstedmoder og ærenpris.	Mindre godkendelse i bl.a. etableret rajgræs og rødsvingel. 1 beh. pr. sæson.
Zypar	0,75-1,0 ltr.	2-3°C	Bredeste effekt på alm. tokimbladet ukrudt samt storkenæb, lægejordrøg, tvetand, hundepersille m.fl.	Mindre godkendelse i bl.a. alm. rajgræs og rødsvingel udlagt i dæksæd i st. 23-32.
Primus XL	0,75-1,0 ltr.	> 5°C	Kræver bedre temperaturer end Zypar.	Ordinær godkendt i frøgræs i st. 20-39.
Catch	0,6 ltr.	>5°C	Kræver bedre temperaturer end Zypar.	Mindre godkendelse i bl.a. rajgræs og rødsvingel i st. 20-32.
Mustang Forte	0,75-1,0 ltr.	>10-12°C	God effekt mod rodukrudt.	Mindre godkendelse og kun i rajgræs i st. 30-32!
Ariane FG S	2,5 ltr.	>10-12°C	God effekt mod rodukrudt.	Ordinær godkendt i frøgræs i st. 21-31. 2,0-2,5 (1. årsmarker); 2,5-3,0 (flerårsmarker)

Effekt af Zypar kontra Catch, PlanteværnOnline, ukrudt med > 6 blade



Effekt af Zypar kontra Primus XL, PlanteværnOnline, ukrudt med > 6 blade



Græsukrudt i rødsvingel i foråret

Kemisk bekæmpelse af rapgræsser er desværre vanskelig og til tider umulig, og samtidig kan midlerne være hårde ved afgrøden.

Bekæmpelse af enårig rapgræs med Hussar Plus OD i rødsvingel

Hussar Plus OD er godkendt til mindre anvendelse mod enårig rapgræs i rødsvingel i foråret, og anvendes bedst som opfølgning på en behandling med samme middel i efteråret, tidligt på små planter under lune forhold (>7-8°C). Problemet med enårig rapgræs i rødsvingel skal dog være stort, førend en behandling iværksættes, da rødsvingel kan blive "sat" af en behandling, hvis det efterfølgende bliver tørt.

Er der anvendt 0,05 l/ha Hussar Plus OD i efteråret, kan der anvendes 0,05-0,09 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Renol i foråret. Er der ikke foretaget en behandling i efteråret, anvendes en splitstrategi i foråret med 2 x 0,07 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Renol, hvor første sprøjtning foretages hurtigst muligt, og den opfølgende behandling 2-3 uger senere. Hussar Plus OD skal altid tilsættes 0,5 l/ha Renol. Halm må ikke opfodres. Læs etikette før brug.

Bekæmpelse af agerrævehale, flyvehavre, kvik og vindaks i rødsvingel

0,4-0,8 l/ha Agil 100 EC + 0,15 l/ha Spredeklæbemiddel *eller* 1,0-2,0 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash kan anvendes under gode temperaturforhold. Kvik bør bekæmpes, når det har 3-4 blade. Laveste dosis forhindrer kvikken i at sætte frø. Begge midler er godkendt til mindre anvendelse. Halm må ikke opfodres for Agil. Kan ikke blandes med vækstreguleringsmidler på grund af risiko for afgrødeskade. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson for Agil – samlet dosis efterår og forår er max. 0,8 l/ha, og maks. 1 behandling pr. sæson for Focus Ultra.

Græsukrudt i alm. rajgræs i foråret

Bekæmpelse af alm. rapgræs, vindaks og flyvehavre i alm. rajgræs

Primera Super er godkendt til mindre anvendelse mod ovenstående arter i alm. rajgræs. Midlet skal først anvendes ved begyndende strækning og under gode og lune vækstforhold (>10-12°C). Der skal anvendes 0,8-1,0 l/ha Primera Super + 0,2 l/ha spredeklæbemiddel for god effekt. Halm må ikke opfodres. Læs etikette før brug.