

VÆKST

2021 – uge 17

Bladrandbiller i ærter og hestebønner fra vækststart

I fremspiringsfasen og frem til at bælgæden er ca. 10 cm høj, skal der holdes øje med angreb af bladrandbiller i bælgæden. Der findes nu angreb i flere af de tidligst fremspirede marker. Bladrandbiller skal bekæmpes med det samme, man ser de første gnav i bladpladerne (1 gnav pr. plante). Foruden at "sætte" bælgæden i den tidlige og vigtige vækstfase, gør billernes larver efterfølgende stor skade ved at gnave på bælgædens kvælstof-fikserende rodknolde. Larvernes gnav på disse reducerer således bælgædens kvælstofforsyning i resten af sæsonen og dermed udbyttet i både hkg og protein.



Billede 1 og 2. Bladrandbiller forårsager de karakteristiske "billetklip" i bladene. Her i hhv. ærter (til venstre) og hestebønner (til højre).



Billede 3. Larver af bladrandbiller, som her gnaver på de kvælstof-fikserende rodknolde og rødder i hestebønner.

Middelvalg ved behov for bekæmpelse:

Anvend 0,1-0,15 kg/ha Lamdex mod bladrandbiller. Samme dosis kan også anvendes i Karate 2,5 WG, som må opbevares og bruges frem til 1.7.2021. I ærter må der også anvendes 0,15-0,2 l/ha Mavrik/Mavrik Vita mod bladrandbiller.