

VÆKST

2021 – uge 17

Ukrudt i udlæg af rent græs, kløvergræs og lucerne til foder

Ukrudt i udlæg med bælgædsarter skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt. I helsæd er det ikke afgørende, om der er lidt ukrudt tilbage i bunden af afgrøden. Sprøjt under gode temperaturforhold (minimum 12-15°C) for at få optimal virkning af Fighter 480.

Udlæg af græs i vårbyg

Græsudlæg af rajgræs og rødsvingel tåler flere af de samme midler, som anvendes i vårsæd uden udlæg. F.eks. er Express 50 SX/Trimmer SG, Primus XL, Pixxaro EC, Zypar og DFF/Legacy tilstrækkelig skånsom. Hvis anvendelsen i udlæg ikke er angivet på etiketten, kan produktansvar dog ikke gøres gældende. Ally 20 SX og Express Gold 33 SX bør ikke anvendes, fordi skånsomheden overfor græsset ikke er tilstrækkelig. Mustang forte er på grund af en række restriktioner med hensyn til anvendelse af halm og etablering af efterfølgende afgrøder med bælgplanter ikke egnet på kvægejendomme (se i øvrigt VÆKST – Ukrudtsbekæmpelse i vårkorn).

Udlæg af kløvergræs i vårbyg, ærter og byg/ærtehelsæd

Det er vigtigt, at ukrudtsbekæmpelsen er skånsom overfor kløveren. Det eneste middel, der er fuldt skånsomt overfor kløveren er Fighter 480. Stomp SC er lidt hård mod udlæg af kløver, og frøene skal være dækket af jord. Behandlingen bør afvente, at hovedparten af kløverplanterne har udviklet første løvblad (spadebladet).

Det anbefales at anvende 0,5 -1,0 l/ha Fighter 480 + 0,5-0,9 l/ha Stomp CS.

Hvor ukrudtet er småt og bestanden af især fuglegræs og stedmoder er moderat, kan Stomp SC udelades. For mere sikker effekt kan 0,5 l/ha Renol tilsættes i vårbyg med udlæg, mens tilsætning af Renol kan være *(for)* hård i ærter og byg/ærter med udlæg. Tilsætning af olie øger effekten på ukrudtet, men reducerer skånsomheden.

Udlæg af lucerne i vårbyg

I udlæg af lucerne "behøves" ikke en fuldstændig effekt af ukrudtsbehandlingen, da overlevende ukrudt ikke kan klare sig det efterfølgende år med gentagne slæt. Lucerneudlæg med kimblade tåler Fighter 480 + olie, hvilket giver mulighed for en tidlig behandling på ukrudt på kimbladstadiet.

Fighter 480 + Stomp CS + olie tåles af lucerneudlæg, når lucernens første løvblad (spadebladet) er udviklet. Hvis Stomp CS skal anvendes, skal udlægget være etableret, så frøene er dækket af jord, og der ikke er mulighed for direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske. Dette passer med, at lucerne skal sås i 2-3 cm's dybde, da bakteriepodningen ikke tåler lys, udtørring og frost.

Bekæmpelse af flyvehavre, hanespore og grøn skærmaks i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs og lucerne

0,8 ltr./ha Primera Super + 0,15 ltr./ha Spredeklæbemiddel kan anvendes mod flyvehavre senest i byggens st. 30 med samtidig effekt på hanespore og grøn skærmaks og med begrænset risiko for at påvirke udlæggene. Da anvendelsen ikke er angivet på etiketten, kan der dog ikke gøres produktansvar gældende.