

## Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel

Målrret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær. Rapgræsser (enårig og alm.) er et alvorligt problem, fordi arterne påvirker kvaliteten i den høstede vare og ikke - eller kun vanskeligt - kan frarenses. Kemisk bekæmpelse af rapgræsser er desværre vanskelig og til tider umulig, og samtidig kan midlerne være hårde ved afgrøden. Haremad og skræppe er vanskelige at frarenses i alle de storfrøede græsarter/sorter. Endelig skal de arter bekæmpes, som forekommer i så store mængder, at der er risiko for direkte udbyttetab, høstbesvær eller kraftig forøgelse af frøpuljen i jorden.

### Græsukrudt i rødsvingel i foråret

#### Bekæmpelse af enårig rapgræs med Hussar Plus OD i rødsvingel

Hussar Plus OD er godkendt til mindre anvendelse mod enårig rapgræs i rødsvingel i foråret, og anvendes bedst som opfølgning på en behandling med samme middel i efteråret, på små planter ved kørsel under lune forhold (over 7-8°C). Da den enårige rapgræs har groet hele vinteren i det milde vejr, er det vigtigt (hvis ikke allerede foretaget), at foretage en bekæmpelse hurtigst muligt efter, at vi er på den anden side af den nuværende periode med nattefrost. Problemet med enårig rapgræs i rødsvingel skal dog være stort, førend en behandling iværksættes, da rødsvingel kan blive "sat" af en behandling, hvis det efterfølgende bliver tørt.

Er der anvendt 0,05 l/ha Hussar Plus OD i efteråret, kan der anvendes 0,05-0,09 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Renol i foråret. Er der ikke foretaget en behandling i efteråret, anvendes en splitstrategi i foråret med 2 x 0,07 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Renol, hvor første sprøjtning foretages hurtigst muligt, og den opfølgende behandling 2-3 uger senere. Hussar Plus OD skal altid tilsættes 0,5 l/ha Renol. Halm må ikke opfodres. Læs etikette før brug.

#### Bekæmpelse af agerrævehale, flyvehavre, kvik og vindaks i rødsvingel

0,4-0,8 l/ha Agil 100 EC + 0,15 l/ha Spredeklæbemiddel eller 1,0-2,0 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash kan anvendes under gode temperaturforhold. Kvik bør bekæmpes, når det har 3-4 blade. Laveste dosis forhindrer kvikken i at sætte frø. Begge midler er godkendt til mindre anvendelse. Halm må ikke opfodres for Agil. Kan ikke blandes med vækstreguleringsmidler på grund af risiko for afgrødeskade. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson for Agil – samlet dosis efterår og forår er max. 0,8 l/ha, og maks. 1 behandling pr. sæson for Focus Ultra.

### Græsukrudt i alm. rajgræs i foråret

#### Bekæmpelse af alm. rapgræs, vindaks og flyvehavre i alm. rajgræs

Primera Super er godkendt til mindre anvendelse mod ovenstående arter i alm. rajgræs. Midlet skal først anvendes ved begyndende strækning og under gode og lune vækstforhold (over 10-12°C). Der skal anvendes 0,8-1,0 l/ha Primera Super + 0,2 l/ha spredeklæbemiddel for god effekt. Halm må ikke opfodres. Læs etikette før brug.

## Tokimbladet ukrudt i foråret

### Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i rødsvingel og alm. rajgræs

Almindelig tokimbladet ukrudt bør bekæmpes tidligt forår, mens rodukudt som skræpper, tidsler m.v. først kan bekæmpes senere i foråret i begyndende strækning under lune forhold med Ariane FG S. (rødsvingel og alm. rajgræs) eller Mustang Forte (kun alm. rajgræs). Midlernes anbefalede dosis og temperaturafhængighed for god effekt ses i tabel 1.

**Tabel 1.** Anbefalet dosis og temperaturkrav ved de forskellige midler mod tokimbladet ukrudt.

| Anbefales dosis og temperaturkrav ved de forskellige midler |  |                         |                                  |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|
|   | Zypar /<br>DFF/Legacy                  | Catch /<br>Primus XL    | Ariane FG S.* /<br>Mustang Forte |
| <b>Anbefalet dosis</b>                                      | 0,75 l/ha /<br>0,06 l/ha som iblanding | 0,6 l/ha /<br>0,75 l/ha | 2,5 l/ha /<br>1,0 l/ha           |
| <b>Temperaturkrav</b>                                       | 2-3°C                                  | Over 5°C                | Over 10-12°C                     |

\*For Ariane FG S gælder: maks. 2,5 l/ha i 1. års marker udlagt i korn og maks. 3,0 l/ha i flerårsmarker.

Se tabel 2 for valg af midler/middelsammensætning afhængig af dominerende arter i marken.

**Tabel 2.** Valg af midler/middelsammensætning afhængig af dominerende arter i marken.

| Tokimbladet ukrudt                | Midler*   |
|-----------------------------------|---|
| Agertedmoder, ærenpris og tvetand | DFF/Legacy (agerstedmoder desuden Catch)                        |
| Fuglegræs                         | Primus XL, Catch, Ariane FG S, Mustang forte, Starane XL, Zypar |
| Haremad                           | Primus XL, Catch, Ariane FG S, Mustang forte, Zypar             |
| Hønsetarm                         | Ariane FG S, Mustang forte                                      |
| Kamille                           | Primus XL, Catch, Mustang forte                                 |
| Skræppe                           | Starane XL  |
| Storkenæb                         | Zypar, Ariane FG S, Mustang Forte                               |
| Tidsel                            | Ariane FG S, Mustang forte                                      |
| Vejbred                           | Ariane FG S   |

\*Zypar, Catch og DFF/Legacy er alle godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs og rødsvingel, mens Mustang Forte kun er godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs. Primus XL og Ariane FG S. er ordinær godkendt til brug i frøgræs. Halm må kun opfodres, hvis der anvendes Primus XL og/eller Ariane FG S. Læs ALTID etiketterne før brug.