

Bekæmpelse af rodukrudt og spildkartofler i vårkorn

Den bedste effekt mod spildkartofler, tidsler, gråbynker, padderokker og andet rodukrudt opnås ved at udføre en bekæmpelse i kornets *begyndende* strækning (st. 31-32), hvor man er sikker på, at alle nye skud er fremme, og man opnår en effektiv virkning ned i ukrudtets udløbere. Bemærk dog, at "deadline" for brug af Mustang Forte er st. 32 (begyndende strækning), for MCPA (Metaxon) st. 39 (fanebladet fuldt udviklet) og for Pixxaro st. 45 (senest begyndende skridning). For sen anvendelse af midlerne i forhold til de nævnte stadier er hård ved afgrøden og koster udbytte. I vintersæden er "løbet således kørt" i vinterbyg og vinterrug, mens der endnu er en sidste chance i vinterhvedemarkerne med MCPA og Pixxaro.

I kartoffelsædskeerterne skal man være opmærksom på, at der i år er langt flere spildkartofler i markerne end normalt på grund af den milde vinter. Er der større udfordringer i markerne med spildkartofler og/eller rodukrudt, er det vigtigt at følge en behandling ved begyndende strækning op med en behandling med glyphosat før eller efter høst under hensyntagen til gældende regler og muligheder herfor. Uanset valg af middel mod spildkartofler vil der stadig blive sat døtreknolde, som giver genvækst den følgende sæson. Glyphosat før høst, som er tilladt i foderafgrøder, ødelægger døtreknoldene, så genvækst den følgende sæson bliver begrænset. Mod agerpadderok har glyphosat dog INGEN effekt, hvorfor eneste effektive løsning er anvendelse af fuld dosis MCPA (Metaxon) senest i st. 39.

Se tabel 1 for anbefalede løsninger mod rodukrudt og spildkartofler i vårkorn. Se i øvrigt tidligere udsendt VÆKST om ukrudtsbekæmpelse i vårkorn.

Tabel 1. Anbefalede løsninger mod rodukrudt og spildkartofler i vårkorn.

Ukrudtsarter	Middel*	Dosis pr. ha	Bemærkning
St. 30-32 Spildkartofler, gråbynker, følfod, svinemælk, agertidsler	Mustang Forte	0,75 ltr.	Vær opmærksom på restriktionerne for efterfølgende afgrøde og halmanvendelse. Bl.a. må kartofler og roer først etableres 14 mdr. efter behandling og bælgstæd 24 mdr. efter. Læs midlets etikette. Mod rodukrudt køres til den sene side for at sikre, at alle rodskud er fremspiret – dog senest i st. 32.
St. 30-32 og senest st. 45 Spildkartofler	Pixxaro	0,35 ltr.	IKKE i havre. Pixxaro har ingen restriktioner ift. efterfølgende afgrøde.
St. 30-39 Agerpadderok, tidsler, svinemælk, gråbynke	MCPA + Ammoniumsulfat	1,0 ltr. + 2,0 ltr.	Kræver varmt vejr og min. 200 l/ha vand. Bemærk – MCPA er eneste effektive løsning mod agerpadderok. Glyphosat før eller efter høst har INGEN effekt på agerpadderok. Tilsætning af ammoniumsulfat øger effekten mod tidsler og især agerpadderok. Der bør være ca. 2 uger mellem alm. ukrudtssprøjtning og MCPA, så rodskud er kommet i god vækst igen, når MCPA anvendes.

*Midlerne – anvendt solo eller for MCPA's vedkommende i blanding med et andet middel - har også effekt på alm. tokimbladede ukrudtsarter, hvis ikke tidligere bekæmpelse heraf er udført. Se tidligere udsendt VÆKST om ukrudtsbekæmpelse i vårkorn.