

## Bladrandbiller i ærter og hestebønner fra vækststart

I fremspiringsfasen og frem til at bælg sæden er ca. 10 cm høj, skal der holdes øje med eventuelle angreb af bladrandbiller i bælg sæden. Det lune og tørre vejr i den seneste periode har givet angreb i de tidligst fremspirede marker. De skal bekæmpes med det samme, man ser de første gnav i bladpladerne (1 gnav pr. plante). De voksne biller kan med deres bid "sætte" bælg sædens vækst i en meget afgørende periode set ift. bl.a. bælg sædens konkurrenceevne overfor ukrudt. Desuden bør billerne bekæmpes for at undgå efterfølgende larveangreb med gnav på de vigtige N-fikserende rodknolde.



**Billede 1 og 2.** Bladrandbiller forårsager de karakteristiske "billetklip" i bladene. Her i hhv. ærter (til venstre) og hestebønner (til højre).



**Billede 3.** Larver af bladrandbiller, som her graver på de N-fikserende rodknolde og rødder i hestebønner.

Anvend 0,20 kg/ha Karate 2,5 WG/Lamdex mod bladrandbiller.

Karate 2,5 WG/Lamdex må maks. anvendes 3 gange pr. vækstsæson.

Allan G B Poulsen, 9698 2388

**HIMMERLANDS  
GROVVARE** A/S

Aars Afd. Rostrup Afd. Skals Afd. Skalmstrup Afd. Aarhus Afd.  
Tlf. 96 62 22 96 Tlf. 96 56 42 11 Tlf. 96 69 60 55 Tlf. 96 47 81 43

**DLA Agri**

Vibeke Fabricius