

VÆKST

2020 – uge 24


Tæger og cikader i kartofler

Tæger

Det er nu markerne skal tjekkes for tæger. Tæger bekæmpes ved randsprøjtning med 0,3 kg/ha Karate 2,5 WG/Lamdex, når de første symptomer på angreb ses. Derved undgår man kraftige angreb senere på sæsonen.

Cikader

Begyndende indflyvning af cikader blev registeret i uge 21 i registreringsnettet, men ikke alle kartofler var kommet op på dette tidspunkt, så optimalt bekæmpelsestidspunkt afhænger således af, hvornår kartoflerne er lagt/kommet op. Skadevirkningen af de indflyvende cikader er begrænset, men det er meget vigtigt at de bekæmpes, så opformering begrænses. **Første Bekæmpelse foretages ca. 3-5 uger efter begyndende indflyvning.** Fra begyndelsen af juli ses næste generation cikader på undersiden af bladene. Cikadenymferne lever af plantesaft, som de får ved at suge på bladene. Symptomerne af sugningen ses først som en gul/brun farvning af de nedre blade. I august/september fremskyndes derved nedvisningen, så tilvæksten stopper for tidligt.



Indflyvning af cikader



cikadenymfer



Symptomer på sugning af cikadenymfer



For tidlig nedvisning pga. cikader

Bekæmpelse af cikader

I år skal kartofler lagt til og med påske sprøjtes mod cikader fra nu (uge 24) og ind i uge 25 med 0,15-0,25 kg/ha Mospilan SG. Kartofler lagt efter påske behandles i uge 25-26 med samme middel og dosering. Højeste dosis anvendes ved kraftige angreb og/eller i modtagelige sorter som f.eks. Saturna, Kardal og Oleva. For at sikre optimal virkning under alle forhold kan der med fordel tilsættes et additiv. Hvis der er behov, udføres yderligere en behandling ca. 4 uger senere med 0,25 kg/ha Mospilan SG for at få så lang en virkningstid som muligt. Når insekt- og skimmelsprøjtning kombineres, anbefales det at blande med Ranman Top.

Allan G B Poulsen, 9698 2388

HIMMERLANDS
GROVVARER A/S

Aars Afd. Rostrup Afd. Skals Afd. Skalmstrup Afd. Aarhus Afd.
TE: 96 42 22 86 TE: 96 56 42 11 TE: 96 69 60 55 TE: 96 47 81 43

DLA Agro

Vibeke Fabricius