

# VÆKST

2018 – uge 15

## Ukrudtsbekæmpelse i vårkorn

Ukrudtsbekæmpelsen i vårkorn bør senest foretages, når det største ukrudt har ca. 3-4 løvblade. På dette stadie vil langt det meste ukrudt, inkl. sent fremspirende arter som hanekro og snerlepileurt, være fremspiret. For at forebygge resistens og sikre en bred løsning anbefales at anvende en blanding af midler svarende til samlet halv dosis. Dosis hæves, hvis ukrudtet bliver stort inden bekæmpelse. Se tabel 1 for valg af midler mod vanskelige ukrudtsarter.

På lavbundsarealer kan der ofte være behov for 2-3 sprøjtninger. Husk at SU-midler som Express, Ally, Hussar m.v. og deres parallelprodukter kun må anvendes én gang pr. vækstsæson.

Tabel 1. Basismidler mod vanskelige ukrudtsarter.

Vanskelige ukrudtsarter	Basismidler
Enårig rapgræs, (alm. rajgræs)	DFF/Legacy inden fremspiring <i>eller</i> Hussar Plus OD på ukrudtets kimbladstadiet i vårbyg og vårhvede
Storkenæb, lægejordrøg	Zypar <i>eller</i> Pixxaro
Gul okseøje	Mustang Forte* <i>eller</i> Ally (+ MCPA)
Agerrævehale, ital. rajgræs i vårhvede	Broadway + PG26N
Spildkartofler	Pixxaro + Starane 333 <i>eller</i> Mustang Forte
Flyvehavre i vårbyg og vårhvede	Primera Super + spredeklæbemiddel
Rodukrudt som tidsler, gråbynke, skræppe og agerpadderok, når skuddene er godt fremme	Mustang Forte* <i>eller</i> MCPA + ammoniumsulfat + spredeklæbemiddel

\*Mustang Forte har restriktioner for efterfølgende afgrøde og passer ikke ind i sædskifter med roer, kartofler, bælgeplanter og specialafgrøder.

## Ukrudtsbekæmpelse i havre:

Hussar Plus OD, DFF/Legacy, Pixxaro og Zypar må ikke anvendes i havre. Det betyder at der ikke er mulighed for at bekæmpe græsser eller flyvehavre. Ally/Nicanor er godkendt men kan give en gulfarvning af havre. Hvor der er stedmoder, er Ally/Nicanor dog eneste mulighed for at få effekt.

Ukrudtsarter	Middel	Dosering pr. ha	Bemærkning
St. 20-30 Burrenerre, fuglegræs, hejrenæb, kamille, korsblomstret ukrudt, pileurter m.fl.	Express SX/Trimmer + Primus XL + spredeklæbemiddel	5 g + 0,3-0,5 ltr. + 0,15 ltr.	Højeste dosis af Primus XL ved begyndende resistente fuglegræs.
St. 20-29 Burrenerre, fuglegræs, hanekro, kamille, pileurter, korsblomstret ukrudt kornblomst, gul okseøje, gråbynke, tidsler m.fl.	Mustang Forte	0,5-0,75 ltr.	Anvendes senest st. 32 og kan anvendes med op til 0,75 ltr./ha i st. 21-32. <b>Kør tidligt mod gul okseøje. Mod rodukrudt køres til den sene side for at sikre, at alle rodskud er fremspiret.</b> Læs etikette om forbehold for efterfølgende afgrøder og halmanvendelse. Ved større forekomster af stedmoder og ærenpris tilsættes 5-8 g Ally SX/Nicanor.
St. 30-39 Tidsler, gråbynke, agerpadderok m.fl.	MCPA + ammoniumsulfat + spredeklæbemiddel	1,0 ltr. + 2 ltr. + 0,2 ltr.	Virkning bedst i varmt vejr og ved min. 200 ltr./ha vand.

Allan G B Poulsen, 9698 2388

**HIMMERLANDS  
GROVVARER A/S**

Aars Afd.    Rostrup Afd.    Skals Afd.    Skalmstrup Afd.    Aarhus Afd.  
TEL 98 62 22 66    TEL 98 56 62 11    TEL 98 69 60 55    TEL 98 47 81 43

**DLA Aggro**

Vibeke Fabricius

## Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg og -hvede m. og u. rajgræs/rødsvingel til frø, foder og efterafgrøder:

Ukrudtsarter	Middel	Dosering pr. ha	Bemærkning
Enårig rapgræs, stedmoder, ærenpris, fuglegræs, kamille, hyrdetaske m.fl.	<u>Lige efter såning:</u> DFF/Legacy	150/100 ml.	<b>Splitsprøjtning anbefales</b> ved udlæg af rajgræs og rødsvingel til frø samt ved reduceret jordbearbejdning og/eller megen enårig rapgræs. DFF/Legacy udbringes umiddelbart efter såning, og der følges op på nyfremspiret ukrudt. Mod resistent fuglegræs erstattes Express SX/Trimmer med Pixxaro/Zypar.
	<u>Opfølgning st. 12-14:</u> Express SX/Trimmer + spredeklæbemiddel	5-8 g + 0,15 ltr.	
St. 10-12 Enårig rapgræs, rajgræs, vindaks, alm. tokimbladet ukrudt	Hussar Plus OD* + DFF/Legacy + Renol	40-70 ml. + 50 ml. + 0,5 ltr.	Især aktuell ved reduceret jordbearbejdning/frøgræs i sædskiftet. Der kan tilsættes DFF/Legacy <i>eller</i> Pixxaro efter behov. Græsukrudt skal bekæmpes tidligt – anvend største dosering ved meget græsukrudt. <b>Må ikke anvendes ved udlæg af græs til frø, foder og efterafgrøder.</b>
St. 12-14 Stedmoder, ærenpris, burrenerre, fuglegræs, hanekro, melde, kamille, korsblomsret ukrudt, pileurt m.fl.	Express SX/Trimmer + DFF/Legacy + Zypar / Pixxaro + spredeklæbemiddel	5-8 g + 50 ml. + 0,3 / 0,15 ltr. + 0,15 ltr.	Løsningen er meget bredspektet og effektiv mod bl.a. lægejordrøg og storkenæb
St. 20-29 Burrenerre, fuglegræs, hanekro, kamille, pileurter, korsblomstret ukrudt kornblomst, gul okseøje, gråbynke, tidsler m.fl.	Mustang Forte	0,5-0,75 ltr.	Anvendes senest st. 32 og kan anvendes med op til 0,75 ltr./ha i st. 21-32. <b>Kør tidligt mod gul okseøje. Mod rod ukrudt køres til den sene side for at sikre, at alle rodskud er fremspiret.</b> Læs etikette om forbehold for efterfølgende afgrøder og halmanvendelse. Ved større forekomster af stedmoder og ærenpris tilsættes 50 ml./ha DFF/Legacy. Alternativt kan DFF/Legacy udbringes lige efter såning og inden fremspiring.
St. 14-25 Flyvehavre, vindaks	Primera Super + spredeklæbemiddel	0,8-1,0 ltr. + 0,15 ltr.	<b>Må ikke anvendes ved udlæg af rajgræs til frø, foder og efterafgrøder. Anvendes senest i st. 30.</b> Der skal gå minimum en uge mellem ukrudtsbehandling og en flyvehavrebekæmpelse. Alternativt kan der foretages en samlet ukrudts- og flyvehavrebekæmpelse med 5-7 g Express SX/Trimmer + 50 ml. DFF/Legacy + 0,8-1,0 ltr. Primera Super + 0,15 ltr. Spredetælbemiddel pr. ha. I vårhvede kan der istedet anvendes 145 g/ha Broadway + 0,5 ltr./ha PG26N senest st. 32.
St. 30-39 Tidsler, gråbynke, agerpadderok m.fl.	MCPA + ammoniumsulfat + spredeklæbemiddel	1,0 ltr. + 2 ltr. + 0,2 ltr.	Virkning bedst i varmt vejr og ved min. 200 ltr./ha vand.

\* Hvis Hussar Plus OD blandes med mangan eller Starane/Pixxaro tilsættes spredeklæbemiddel. Bruges Hussar alene eller i blanding med DFF tilsættes 0,5 l/ha Renol.