

VÆKST

2018 – uge 21

Tæger og cikader i kartofler

Tæger

Det er nu markerne skal tjekkes for tæger. Tæger bekæmpes ved randsprøjtning med 0,3 kg/ha Karate 2,5WG, når de første symptomer på angreb ses i kartoflerne. Derved undgår man kraftige angreb senere på sæsonen.

OBS: Selvom der er bejdset med Prestige, skal der sprøjtes mod tæger, da Prestige ikke har tilstrækkelig virkning på tæger.

Fakta om cikadebekæmpelse

Indflyvning af cikader begynder normalt i slutningen af maj. Skadevirkningen af de indflyvende cikader er begrænset, men det er vigtigt, at disse bekæmpes, så opformering begrænses. Fra begyndelsen af juli ses næste generation cikader på undersiden af bladene. Cikadenymferne lever af plantesaft, som de får ved at suge på bladene. Symptomerne af sugningen ses først som en gul/brun farvning af de nedre blade. I august/ september fremskyndes nedvisningen, så tilvæksten stopper for tidligt.

Indflyvning


Fra slutningen af maj
Temperaturbestemt
Æglægning 2 til 3 uger
Begrænset skadevirkning

Cikadenymfer

Fra begyndelsen af juli
Temperaturbestemt
Findes på underside af blad
STOR skadevirkning

Skadevirkning

Fremskynder nedvisning
Reducerer udbytte/stivelse



Indflyvning af cikader



cikadenymfer



Symtomer på sugning af cikadenymfer



For tidlig nedvisning pga. cikader

VÆKST

2018 – uge 10

Side 2

Bekæmpelse af cikader

Hvor der ikke er behandlet med Prestige, skal der sprøjtes mod cikader **i ugen før Sankt Hans (uge 24)**

Anbefaling:

- 0,15-0,25 kg/ha Mospilan
- Højeste dosis anvendes i modtagelige sorter som f.eks. Saturna, Kardal og Oleva.
- For at sikre optimal virkning under alle forhold kan der med fordel tilsættes et additiv.
- Når insekt- og skimmelsprøjtning kombineres, anbefales det at blande med Ranman Top.