



## PLANTEVÆRN I VINTERRAPS, EFTERÅR 2018

SKADEVOLDER / PROBLEM	MIDDEL	DOSIS PR. HA	BEMÆRKNINGER
Enårig rapgræs, hyrdetaske, burresnerre, tvetand, fuglegræs, ærenpris	Centium 36 CS / Kalif 360 CS	0,2-0,25 ltr.	Umiddelbart efter såning og inden fremspiring. Der kan under etableringsfasen opstå forbigående lysfarvning af rapsen - især efter kraftigt regn på let sandjord.
Kamille, hyrdetaske, burre-snerre, storkenæb, hejrenæb, kornblomst, tvetand, fuglegræs, valmue, forglemmigej	Belkar*	På rapsens 6- bladstadiet: 0,4-0,5 ltr.	I marker med stort ukrudtstryk, specielt storke-/hejrenæb, kan bekæmpelsen med fordel udføres som en delt behandling. 1. splithandling med 0,25 ltr./ha udføres, når rapsen har 2-3 blade, og anden behandling med samme dosis ca. 3 uger senere på nyfremspiret ukrudt.
Spildkorn	Agil 100 EC	0,3-0,5 ltr.	Bekæmpelse af spildkorn af vårbyg, vinterbyg, vinterhvede og vinterrug med 2-3 blade. Højeste dosis mod spildkorn af rug og hvede. Ved doseringer under 0,3 l/ha tilsættes sprede/klæbemiddel. Splitbehandling med 2 * 0,37 ltr./ha kan være nødvendig ved direkte såning.
Spildfrø af rajgræs, spildkorn, agerrævehale, vindaks, gold- og blød hejre	Focus Ultra + Dash	1,0-2,0 ltr. + 0,5 ltr.	Når græsset har 2-3 blade. Behandles kun mod spildkorn kan dosis reduceres.
Enårig rapgræs, græsser generelt	Kerb	1,0-1,25 ltr.	Såfremt Miljøstyrelsen giver dispensation til anvendelse af Kerb i efteråret 2018. Anvendes i henhold til en given dispensation, og tidligst når jordtemperaturen kommer under 10 °C.
<b>Svampe</b>			
Rodhalsråd (Phoma)	Orius/ Prosaro	0,5 ltr.	Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadiet. Temperatur over 15 °C og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd. Midlerne har samtidig en vækstregulerende sideeffekt, men pas på triazolregler.
<b>Vækstregulering</b>			
Vækstregulering	Caryx/Juventus	0,5-0,7 ltr.	Efterår på rapsens st. 15. Begge midler har samtidig sideeffekt på rodhalsråd og lys bladplet om efteråret.
<b>Skadedyr</b>			
Rapsjordlopper, jordlopper, thrips	Karate 2,5 WG	0,20 kg	Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Er udsæden ikke bejdset med Cruiser, kan det være nødvendigt at behandle både på rapsens 2-3 bladstadiet og senere i efteråret.
Agersnegle	SluXX HP	7,0 kg	Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord. Ved forebyggende behandling umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha (anbefales hvor problemet er velkendt).
<b>Mikronæring</b>			
Bormangel	Bor 150 MEA	2,0-3,0 ltr.	Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade, gerne splitsprøjtning af 2x1,5 ltr./ha.
B,Mg,S,Mn	EPSO Microtop	1-2 x 10 -15kg	Maks. 5 kg/100 ltr. vand.

## Pas på ukrudtsmidlerne når vinterraps sås!

- Hvis der er brugt Monitor/Hussar OD/Hussar Plus OD/Cossack OD i korn forud for vinterraps, bør marken pløjes / jordbearbejdes med samme intensitet, som en pløjning.
- Hvis Legacy/DFF er brugt i foråret, anbefales pløjning før såning af vinterraps.
- Er der anvendt mere end 20 g Ally/Nicanor pr. ha i for- året, skal marken pløjes forud for vinterraps.

## \* DOSERINGSTABEL FOR BELKAR

VINTERRAPS	MAKS DOSERING, LTR./HA
St. 12-15	0,25
St. 16-30	0,50
<b>SPLITBEHANDLING:</b>	
St. 12-15	0,25
3 uger senere	0,25