

VÆKST

2018 – uge 33

Bekæmpelse af stankelbenlarver

Det er kun muligt at bekæmpe stankelbenslarver i efteråret for dermed at forebygge angreb i afgrøder i foråret, hvor de ikke kan bekæmpes. Kun Avaunt er godkendt til bekæmpelse af stankelbenlarver.

Stankelben lægger æg i græs i august til begyndelsen af september. Æggene er følsomme for udtørring og høje temperaturer i august-september. Fugtige og kølige somre efterfulgt af milde og regnrige vintre beskrives at give de bedste forhold for angreb af stankelben. Larverne er mest udbredt på humus-, sand- og marskjord. Normalt findes flest stankelben i 2. og 3. års græsmarker, der har været afgræsset, men ofte kan der også være udfordringer efter frøgræsmarker. Stankelben foretrækker kort græs til æglægning. Behovet for behandling i efteråret skal sammenholdes med egne erfaringer over flere år på den enkelte bedrift.

Mindre anvendelse til Avaunt

Kun Avaunt er godkendt til bekæmpelse af stankelbenlarver. Avaunt er godkendt til mindre anvendelse i græs, kløvergræs og frøgræs med brug af 0,45 l/ha om efteråret. Brugsanvisningen for mindre anvendelse af Avaunt skal udprintes fra middeldatabsen.dk og opbevares. Sprøjtning skal ske i en mild periode ved en nattemperatur over 5°C fra omkring ultimo oktober.

Avaunt virker ved, at larverne skal æde af behandlede blade. Larverne i jorden skal således ikke rammes. Anvend min. 200 l/ha vand og gerne 300 l/ha. Jo større græstæppe jo mere vand anbefales.



Billede 1. Store stankelbenlarver fotograferet i maj.