

# VÆKST

2018 – uge 33

## Ukrudtsbekæmpelse i udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret

Er der / falder der tilstrækkelig regn i denne periode, vil den høje jordtemperatur betyde en hurtig fremspiring, og dermed kan planterne forhåbentlig indhente noget af den manglende vækst fra optimal etablering først i august. Samtidig vil der i flere marker være tilgængeligt kvælstof til rådighed, som forfrugten ikke har kunnet udnytte. Dette kan være med til at bidrage til en hurtig etablering og udvikling.

### Spildkorn

En tidlig høst har forhåbentlig betydet, at spild fra dækafgrøden er ganske minimal. Modsat har der ikke været gode betingelser for spiring af spildkorn i stubben. Spildkorn er næsten umuligt at bekæmpe i alm. rajgræs, og ved evt. pløjefri etablering kan det være aktuelt at etablere frøet efter en bredbladet forfrugt.

Agil 100 EC har en godkendelse til mindre anvendelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Den maksimale dosering er 0,1 l/ha Agil tilsat sprede-klæbemiddel. Den lave dosering sker af hensyn til afgrøden. Der er konstateret betydelige afgrødeskader i forsøgene ved højere doseringer. For at sikre en effekt af den lave dosering, er det vigtigt, at der tilsættes sprede-klæbemiddel, og der skal behandles på små spildkornsplanter med 1 til 2 blade. Løsningen er en brugbar mulighed, men kan ikke løse større problemer. Derfor er en omhyggelig pløjning fortsat grundstenen i bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn efter kornafgrøder.

### Ukrudt

DFF/Legacy, Stomp og Boxer er godkendt til mindre anvendelse. Husk at have vejledningen fra [www.middeldatabasen.dk](http://www.middeldatabasen.dk) liggende før brug af midlet. I tabel 1 ses anbefalede løsninger til bekæmpelse af ukrudt i alm. rajgræs udlagt i renbestand.

Tabel 1. Anbefalede ukrudtsløsninger i alm. rajgræs i udlagt i renbestand i sensommeren

| Ukrudt                                   | Middel   | Dosering pr. ha                            | Bemærkning   |
|--|--|--|--|
| Spildkorn                                | Agil + sprede-klæbemiddel  | 0,1 l + 0,2 l                              | Kun effekt på mindre mængder spildkorn med 1-2 blade. Kan give en vis påvirkning af udlægget.  |
| Enårig rapgræs, vindaks, tokimbl. ukrudt | DFF/Legacy (+ evt. Boxer)  | 0,1-0,15 l (+ evt. 0,5-1,0 l)              | DFF/Legacy skal udbringes umiddelbart efter såning, og frøene skal være dækket af jord.  |
| Tokimbl. ukrudt                          | Express + sprede-klæbemiddel<br><br>eller<br><br>Nuance + sprede-klæbemiddel | 7,5 g + 0,15 l<br><br><br><br>5 g + 0,15 l | Anvendes når udlægget er fuldt fremspiret med 2-3 blade, og på ukrudtets 1-2 bladstadiet.<br><br><br>I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og der er risiko for et lille udbyttetab ved høst. |