

# VÆKST

2019 – uge 21

## Bekæmpelse af rodukrudt og spildkartofler i vårkorn

Den bedste effekt mod tidsler, gråbynker, padderokker og andet rodukrudt opnås ved at trække en bekæmpelse, så man er sikker på, at alle nye skud er fremme. Sprøjt hellere lidt for sent end for tidligt. Tidsler er følsomme, når de har fået 4-7 blade, dvs. når tidslerne er 15-25 cm, hvor saftstrømmen begynder at gå nedad, så midlerne bliver transporteret ned i udløberne. Bemærk dog, at "deadline" for brug af Mustang Forte er st. 32 (begyndende strækning), for MCPA (Metaxon) st. 39 (fanebladet fuldt udviklet) og for Pixxaro st. 45 (senest begyndende skridning). I vintersæden er "løbet således kørt" i vinterbyg og vinterrug, mens der endnu er en sidste chance i vinterhvedemarkerne med MCPA og Pixxaro.

Er der større udfordringer i markerne med rodukrudt, er det vigtigt, at følge en behandling i afgrøden op med en behandling med glyphosat før eller efter høst under hensyntagen til gældende regler og muligheder herfor. Mod agerpadderok har glyphosat dog INGEN effekt, hvorfor eneste effektive løsning er anvendelse af fuld dosis MCPA (Metaxon) senest i st. 39.

Se tabel 1 for anbefalede løsninger mod rodukrudt og spildkartofler i vårkorn. Se i øvrigt tidligere udsendt VÆKST om ukrudtsbekæmpelse i vårkorn.

**Tabel 1.** Anbefalede løsninger mod rodukrudt og spildkartofler i vårkorn.

Ukrudtsarter	Middel*	Dosis pr. ha	Bemærkning
St. 30-32 Spildkartofler, gråbynker, agertidsler.	Mustang Forte	0,75 ltr.	Vær opmærksom på restriktionerne for dyrkning af efterfølgende følsomme afgrøder på 14-24 mdr. efter anvendelsen afhængig af afgrøde, og på begrænsning i anvendelse af halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte. Kartoffler og roer kan etableres 14 mdr. efter behandling og hestebønner og andre bælgplanter 24 mdr. efter.  Mod rodukrudt køres til den sene side for at sikre, at alle rodskud er fremspiret – dog senest i st. 32.
St. 30-32 og senest st. 45 Spildkartofler	Pixxaro	0,35 ltr.	IKKE i havre. Pixxaro har ingen restriktioner ift. efterfølgende afgrøde.
St. 30-39 Agerpadderok, tidsler, gråbynke.	MCPA + Ammoniumsulfat + Spredeklæbemiddel	1,0 ltr. + 2 ltr. + 0,2 ltr.	Kræver varmt vejr og min. 200 l/ha vand. Bemærk – MCPA er eneste effektive løsning mod agerpadderok. Glyphosat før eller efter høst har INGEN effekt på agerpadderok. Der bør være omkring 14 dages afstand mellem ukrudtssprøjtning med "minimiddel" og MCPA, så rodskud er kommet i god vækst igen, når MCPA anvendes.

\*Midlerne – især Mustang Forte og Pixxaro - har også effekt på alm. tokimbladede ukrudtsarter, hvis ikke tidligere bekæmpelse heraf er udført. Se tidligere udsendt VÆKST om ukrudtsbekæmpelse i vårkorn.