

Sprøjteplan efterår 2009



Sprøjteplan efterår 2009

Vælg en løsning, der passer til dit behov


Der findes mange forskellige kombinationer af midler, som kan anvendes i efteråret. I skemaet er det skitseret, hvilke løsninger der virker på de forskellige ukrudtsarter. Uddybende kommentarer kan ses i de enkelte sprøjteplaner under behandlingstidspunkt/bemærkninger.

	0,03-0,05 l DFF + 0,12-0,15 l Oxitril + 1,0 l Stomp Pentagon	0,03-0,05 l DFF + 0,12-0,15 l Oxitril + 1,5 l Stomp Pentagon	0,03-0,05 l DFF + 0,12-0,15 l Oxitril + 1,0 l Boxer	0,03-0,05 l DFF + 10 g Lexus + 1,0 l Boxer	0,75 l Boxer/Stomp Pentagon + 0,40 l Othello OD
Agerstedmoder	●	●	●	●	●
Burresnerre	●	●	●	●	●
Forglemmigej	●	●	●	●	●
Fuglegræs	●	●	●	●	●
Hyrdetaske	●	●	●	●	●
Kamille	●	●	●	●	●
Kornblomst	● ¹	● ¹	● ¹	●	●
Raps	●	●	●	●	●
Tvetand	●	●	●	●	●
Ærenpris	●	●	●	●	●
Alm. rapgræs	●	●	●	●	●
Enårig rapgræs	●	●	●	●	●
Vindaks	●	●	●	●	●
Agerrævehale	●	●	●	●	●
Rajgræs	●	●	●	●	●
Sprøjtetidspunkt	St. 10-12	St. 10-12	St. 10-12	St. 10-12	St. 12-13
Anvendes i alle vintersædsarter	Ja	Ja	Ja	Ja	Hvede, tritica- le og rug

●	Over 85 % effekt
●	70-85 % effekt
●	Under 70 % effekt


1. Ved forekomst af kornblomst øges Oxitril doseringen til 0,5 l/ha.

Vinterhvede, rug, triticale efterår




Skadesårsag	Middel	Behandlingstidspunkt/-bemærkninger	Dosering pr. ha
Tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps, tvetand, forglemmigøj, ærenpris, hyrdetaske, valmue, kornblomst, storkenæb.	DFF + Oxitril + Stomp Pentagon	Fra kornets 1 blad stadie. Højeste dosering af DFF ved stor forekomst af agerstedmoder. Mod kornblomst hæves doseringen af Oxitril til 0,5 ltr. Ved mange storkenæb hæves doseringen af Stomp Pentagon til 1,5 ltr.	0,03-0,05 ltr + 0,12-0,15 ltr + 1,0 ltr
Tokimbladet ukrudt: + Græsukrudt: Alm. rapgræs + enårig Rapgræs + vindaks	DFF + Oxitril + Boxer Eller: Boxer/Stomp Pentagon + Othello OD	Fra kornets 1 blad stadie. Ved mange vindaks anvendes højeste dosering af Boxer. Mod kornblomst hæves doseringen af Oxitril til 0,5 ltr. Højeste dosering af DFF ved stor forekomst af agerstedmoder. Othello OD anvendes først fra kornets 2 bladstadie. Othello OD forbedrer effekten på Alm. rapgræs i forhold til ovennævnte løsning. Mod rajgræs øges doseringen af Othello OD til 0,6 ltr.	0,03-0,05 ltr + 0,12-0,15 ltr + 1,0-1,5 ltr 0,75 ltr + 0,4 ltr
Græsukrudt incl. Agerrævehale + tokimbladet ukrudt f.eks: Kamille, kornblomst, storkenæb, valmue, stedmoder	DFF + Boxer + Lexus	Fra kornets 1 blad stadie. Højeste dosering af DFF ved stor forekomst af agerstedmoder.	0,03-0,05 ltr + 1,0 ltr + 10 gr
Snegle	Ferramol	Udstrøes så snart angreb ses. Højeste dosering på knoldet jord og langs læhegn	10 – 25 kg
Manganmangel	Mangansulfat eller AAA Mangan-nitrat	Så snart mangel ses. I blanding med andre midler bør der ikke bruges mere end 2,0 kg/ha mangansulfat. Der tilsættes sprede-klæbemiddel.	2,0-3,0 kg 1,0-1,5 ltr

Vinterbyg efterår



Skadesårsag	Middel	Behandlingstidspunkt/-bemærkninger	Dosering pr. ha.
Tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps, tvetand, forglemmigej, ærenpris, hyrdetaske, valmue, kornblomst, storkenæb	DFF + Oxitril + Stomp Pentagon	Fra kornets 1 blad stadie. Højeste dosering af DFF ved stor forekomst af agerstedmoder. Mod kornblomst øges doseringen af Oxitril til 0,5 ltr. Ved mange storkenæb hæves doseringen af Stomp Pentagon til 1,5 ltr.	0,03-0,05 ltr + 0,12-0,15 ltr + 1,0 ltr
Tokimbladet ukrudt: + Græsukrudt: enårig Rapgræs + vindaks	DFF + Oxitril + Stomp Pentagon	Fra kornets 1 blad stadie. Højeste dosering af DFF ved stor forekomst af agerstedmoder. Mod kornblomst øges doseringen af Oxitril til 0,5 ltr.	0,03-0,05 ltr + 0,12-0,15 ltr + 1,5 ltr
Græsukrudt incl. Alm. rapgræs, agerrævehale + tokimbladet ukrudt f.eks: Kamille, kornblomst, storkenæb, valmue, stedmoder	DFF + Lexus + Stomp Pentagon	Fra kornets 1 blad stadie. Højeste dosering af DFF ved stor forekomst af agerstedmoder.	0,03 – 0,05 ltr + 10 gr + 1,5 ltr
Snegle	Ferramol	Udstrøes så snart angreb konstateres. Højeste dosering på knoldet jord og langs hegn	10 – 25 kg
Manganmangel	Mangan-sulfat eller AaA Mangan-nitrat	Så snart mangel ses. Iblanding med andre midler bør der ikke bruges mere end 2,0 kg/ha mangansulfat. Der tilsættes spredningsklæbemiddel	2,0 – 3,0 kg 1,0 – 1,5 ltr

Vinterraps efterår



Skadesårsag	Middel	Behandlingstidspunkt/-bemærkninger	Dosering pr. ha
Hyrdetaske, burresnerre, tvetand, fuglegræs, ærenpris, valmue og enårig rapgræs	Command + Stomp	Udsprøjtes senest 3 dage efter såning. Højeste dosering mod burresnerre. Stomp har off-label godkendelse.	0,15 – 0,25 ltr + 0,5 ltr
Spildkorn	Agil + Kontakt eller Focus Ultra + Dash	Udsprøjtes når spildkornet har 1-3 blade. Højeste dosering mod spildkorn af hvede og rug	0,25 – 0,5 ltr + 0,1 ltr 0,5 – 0,7 ltr + 0,5 ltr
Spildkorn + græsser	Focus Ultra + Dash	Udsprøjtes når græsserne har 1-2 blade	1,5 – 2,0 ltr + 0,5 ltr
Agerstedmoder, ærenpris, tvetand, agersennep, hyrdetaske	Fox 480	Behandles når 90 % af rapsplanterne har 4 blade.	0,5 – 0,75 ltr
Rapsjordløpper	Fastac 50	Kun efter behov. Der varsles ved udbredte angreb.	0,25 ltr
Rodhalsråd (Phoma)	Juventus eller	Rodhalsråd kan forekomme ved intensiv dyrkning (smitte fra nabomarker)	0,75 ltr
Vækstregulering	Folicur	Behandling i 4-6 bladstadiet	0,5 ltr
Spildkorn + flyvehavre + græsser + fuglegræs	Kerb 50	Udsprøjtes når jordtemperaturen er under 10 grader. Normalt fra ca. 1. november. Højeste dosering mod spildkorn af hvede og rug. Må anvendes så længe lager haves.	0,6 – 0,8 ltr
Snegle	Ferramol	Udstrøes så snart angreb konstateres. Højeste dosering på knoldet jord og langs hegn.	10 – 25 kg
Manganmangel	Mangan-sulfat eller AAA Mangan-nitrat	Udsprøjtes efter behov inden væksten standser.	2,0 – 3,0 kg 1,0 – 1,5 ltr

Frøgræs efterår

Skadesårsag	Middel	Behandlingstidspunkt/-bemærkninger	Dosering pr. ha
Tokimbladet ukrudt	Oxitril + DFF	Frøgræs udlagt i renbestand sommer/efterår. DFF har Off-label godkendelse i frøgræs. Der behandles når ukrudt har max. 2 løvblade	0,5 ltr + 0,05 ltr
Græsukrudt	Boxer + Stomp	Rajgræs i renbestand. Boxer og Stomp har Off-label godkendelse i rajgræs. Der behandles tidligt efter såning.	0,5 ltr + 0,5 ltr
Tokimbladet ukrudt incl. stedmoder, ærenpris, storkenæb	Express + Fox 480	Efter høst af dæksæd. Inden 30. september	1 tablet + 0,75 ltr + klæbemiddel
Enårig rapgræs Spildkorn	Focus Ultra + Dash	Kun i rødsvingel. Behandling om efteråret på enårig rapgræs i god vækst og inden der sættes frøstængler.	1,0 – 1,5 ltr + 0,5 ltr + 0,4 – 0,7 ltr + 0,5 ltr

Rengøring af sprøjten

For at undgå indtørring af rester rengøres sprøjten straks efter brug.

1. Skyl sprøjten med 100 - 400 liter vand alt efter tankstørrelse.
2. Tilsæt 0,5 liter All Clear Extra pr. 100 liter vand i vaskevand (10 - 15 % af tankkapacitet)
Sprøjte med tankspuledyser arbejder i 15 - 20 minutter.
3. Skyl efter én gang.
4. Vask dyser og filtre med vand tilsat 0,5 liter All Clear Extra pr. 100 liter vand.

Kan udsprøjtes over afgrøden

Opfølgning forår

Hvad følges der op med til foråret?

I tabellen er angivet forskellige aktuelle produkter og deres virkning på udvalgte ukrudtsarter. Den endelige dosering/blanding bestemmes af de aktuelle forhold til foråret.

Mulige løsninger til opfølgende ukrudtsbekæmpelse i foråret.

Produkt	Dosering pr. ha	Ukrudtsarter	
		Græsser	Bredbladet
Ally	0,5 – 1,0 tablet		Stedmoder, kamille, raps, storke­næb
Express	0,7 – 2,0 tablet		Kamille, raps, storke­næb, snerle pileurt
Ally + Monitor	0,5 tab + 8 – 12,5 g	Hejre, alm. rapgræs, vindaks (kvik)	Stedmoder, kamille, raps, burresnerre, snerle pileurt, storke­næb
Monitor	6,5 – 18,75 g	Hejre, alm. rapgræs, vindaks (kvik)	Burresnerre, kamille, raps
Hussar OD	35 – 70 ml	Vindaks, rajgræs	Burresnerre, kamille, raps, snerle pileurt, storke­næb
Primus	0,05 – 0,1 l		Burresnerre, kamille, raps, snerle pileurt, storke­næb, kornblomst
Flurostar	0,3 – 0,6 l		Burresnerre, snerle pileurt
Starane XL	0,5 – 1,0 l		Burresnerre, snerle pileurt, kamille
Lexus	10 – 20 g	Agerrævehale, (vindaks)	Kamille, kornblomst, raps, snerle pileurt, storke­næb
Topik + olie	0,2 – 0,4 l	Agerrævehale, alm. rapgræs, vindaks, flyvehavre, rajgræs	
Atlantis OD	0,45 – 0,9l	Enårig rapgræs, alm. rapgræs	